

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1サイクルの期間	癌腫
mFOLFOX6/BV	アバスチン(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/m ²				
	エルプラット(オキサリプラチン)	85mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
Cetu+sLV5FU2	アービタックス(セツキシマブ)	初回 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	点滴静注	d1,8	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/m ²		d1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
Cetu 単独	アービタックス(セツキシマブ)	初回 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	点滴静注	d1,8	1週間	大腸癌
CPT-11 単独	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	大腸癌、胃癌
FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	イリノテカン	150mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
FOLFIRI/BV	アバスチン(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/m ²				
	イリノテカン	150mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1サイクルの期間	癌腫
FOLFIRI/Cetu	アービタックス(セツキシマブ)	初回 400mg/㎡ 2回目以降 250mg/㎡	点滴静注	d1,8	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	d1		
	イリノテカン	150mg/㎡				
	フルオロウラシル	400mg/㎡	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注			
FOLFIRI/Pani	ベクティビックス(パニツムマブ)	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/㎡				
	イリノテカン	150mg/㎡				
	フルオロウラシル	400mg/㎡	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注			
IRIS	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/㎡/日	内服	d1-14	4週間	大腸癌
	イリノテカン	125mg/㎡	点滴静注	d1,15		
IRIS/BV	アバスチン(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	d1,15	4週間	大腸癌
	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/㎡/日	内服	d1-14		
	イリノテカン	125mg/㎡	点滴静注	d1,15		
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	d1	2週間	大腸癌、胃癌、食道癌
	エルプラット(オキサリプラチン)	85mg/㎡				
	フルオロウラシル	400mg/㎡	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注			

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1サイクルの期間	癌腫
Cetu+CPT-11	アービタックス(セツキシマブ)	初回 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	点滴静注	d1,8	2週間	大腸癌
	イリノテカン	150mg/m ²		d1		
mFOLFOX6/Pani	ベクティビックス(パニツムマブ)	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/m ²				
	エルプラット(オキサリプラチン)	85mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
Pani 単独	ベクティビックス(パニツムマブ)	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
sLV5FU2/BV	アバスチン(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
sLV5FU2/Pani	ベクティビックス(パニツムマブ)	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1サイクルの期間	癌腫
SOX	エルプラット(オキサリプラチン)	130mg/m ²	点滴静注	d1	3週間	大腸癌
	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/m ² /日	内服	d1-14		
SOX/BV	アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	d1	3週間	大腸癌
	エルプラット(オキサリプラチン)	130mg/m ²				
	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/m ² /日	内服	d1-14		
XELOX	エルプラット(オキサリプラチン)	130mg/m ²	点滴静注	d1	3週間	大腸癌、胃癌
	ゼローダ(カペシタビン)	2000mg/m ²	内服	d1-14		
XELOX/BV	アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	d1	3週間	大腸癌
	エルプラット(オキサリプラチン)	130mg/m ²				
	ゼローダ(カペシタビン)	2000mg/m ²	内服	d1-14		
Capecitabine+BV	アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	d1	3週間	大腸癌
	ゼローダ(カペシタビン)	2000mg/m ²	内服	d1-14		
FOLFIRI/RAM	サイラムザ(ラムスルマブ)	8mg/kg	点滴静注	d1	2週間	大腸癌
	レボホリナート	200mg/m ²				
	イリノテカン	150mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
S-1/BV	アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	d1	3週間	大腸癌
	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/m ² /日	内服	d1-14		

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1サイクルの期間	癌腫
FP	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	d1-5	4週間	食道癌
	シスプラチン	80mg/m ²		d1		
GEM/CDDP	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	d1,8	3週間	胆道癌
	ゲムシタビン	1000mg/m ²				
S-1/GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	d1,8	3週間	胆道癌、膵癌
	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/m ² /日	内服	d1-14		
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	4週間	膵癌
GEM/nabPAC	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	4週間	膵癌
	アブラキサン (パクリタキセル)	125mg/m ²				
mFOLFIRINOX	エルプラット(オキサリプラチン)	85mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	膵癌
	レボホリナート	200mg/m ²				
	イリノテカン	150mg/m ²				
	フルオロウラシル	2400mg/m ²				
mFOLFIRINOX(変法)	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	膵癌
	エルプラット(オキサリプラチン)	85mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注			
オニバイド+5-FU/LV	オニバイド	70mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	膵癌
	レボホリナート	200mg/m ²		d1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		d1		

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1サイクルの期間	癌腫
S-1/CDDP	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	d8	5週間	胃癌
	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/m ² /日	内服	d1-21		
Tmab/S-1(変法)	ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	d1,8	3週間	胃癌
	テガフル・オテラシル・ギメラシル配合	80mg/m ² /日	内服	d1-14		
weeklyPAC	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	4週間	胃癌、乳癌
PTX+RAM	サイラムザ(ラムスルマブ)	8mg/kg	点滴静注	d1,15	4週間	胃癌
	パクリタキセル	80mg/m ²		d1,8,15		